

CCSVI: caso clinico

Paziente femmina di 45 anni:

Esordio 96 con parestesie mani e pochi mesi dopo livello sensitivo d8-d9 con disturbo sfinterico. Esegue rmn con quadro compatibile con rmn.pcv alterati.

Febbraio 97: impaccio motorio arto superiore dx → ricovero con liquor: IEF positivo. Inizia Avonex

Nel 98 ricaduta clinica e shift a Rebif 22. (cambio centro di riferimento)

A seguito di alcune ricadute nel 2008 passa a Rebif 44 sospeso poi per leucopenia.

Effettua qualche ciclo di mitoxantrone poi sospeso per intolleranza.

Nel 2009 nuovo episodio midollare (cambio centro di riferimento) con incontinenza urinaria e sfinterica.

Nel 2010 stabilità alla RMN e clinicamente stabile senza terapia

EDSS: 3 emisindrome dx motoria, paraparesi ipertonica, Hoffmann e Babinski +, clono achilleo, urgenza minzionale

Valutazioni funzionali pre e post

	• Test cammino	test 9 pioli	test pasat
• T0:	7,47 sec	33,62	46/60
• T1 _(1 sett) :	7,00	26,22	50/60
• T2 _(1 mese) :	6,25	20,61	
• T3 _(3mese) :	6,98	25,07	
• T4 _(6mesi) :	8,16	22,15	

CCSVI: caso clinico 2

Paziente maschio di 43 anni:

Esordio 96 con EDSS:1,5

Dal 99 al 2007 terapia con Betaferon. Durante il trattamento episodi clinici a cadenza circa annuale con raggiungimento di EDSS 4 nel 2007.

Nel 2008 EDSS 4,5 e iniziali difficoltà di deambulazione effettua terapia con mitoxantrone, sospesa dopo 3 mesi per inefficacia clinica e peggioramento della fatica. Inizia azatioprina.

Ad agosto 2009 improvviso peggioramento della deambulazione e parestesie arti superiori. RMN stabile. Edss:5,5-6. stop azatioprina.

Gennaio 2010 riscontro di 3 lesioni attive alla rmn +enhancement e attività a livello midollare: inizia tysabri.

Edss attuale:6,5

Valutazioni funzionali pre e post

	• Test cammino	test 9 pioli	test pasat
• T0:	35,97 sec	35,93	57/60
• T1 _(1 sett) :	51,20	26,59	57/60
• T2 _(1 mese) :	32,09	27,97	56/60
• T3 _(3mese) :	46,05	23,40	

<http://youtu.be/99Xoe8zdHrs>

```
<iframe width="640" height="480"  
  src="http://www.youtube.com/embed/99Xoe  
  8zdHrs?rel=0" frameborder="0"  
  allowfullscreen></iframe>
```